

การยึดอายุการปักแจ็กกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูด้วยกรด 5-ซัลฟอยาลิซิลิก

พิชญ์สินี ปันตarinทร์*

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาหารวิธีการยึดอายุการปักแจ็กกันของดอกปทุมมาตัดดอกเพื่อการส่งออก โดยได้ทำการศึกษาผลของกรด 5-ซัลฟอยาลิซิลิก (5-sulfosalicylic acid, 5-SSA) ต่อการยึดอายุการปักแจ็กกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู (*Curcuma alimatifolia* Gagnep. Cv. Chiang Mai Pink) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง

การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของระยะเวลาตัดดอก ระดับความเข้มข้นของสาร 5-SSA และระยะเวลาที่ใช้ในการพัลซิ่งต่ออายุการปักแจ็กกันของดอกปทุมมาโดยใช้ดอกปทุมมา 2 ระยะ คือ ระยะที่ตัดกริงยังไม่บาน (ระยะที่ 1) และระยะที่ตัดกริงบาน 1 ดอก (ระยะที่ 2) นำดอกปทุมมาหลังการตัด มาพัลซิ่งในสารละลาย 5-SSA ความเข้มข้นต่างๆ นาน 6 และ 12 ชั่วโมง แล้วนำมาห่อหุ้มปลายก้านดอกด้วยสำลีที่อิ่มตัวด้วยน้ำกลั่นที่บรรจุในถุงพลาสติก ก่อนบรรจุลงในกล่องกระดาษฉุกเฉียบ แล้วนำไปเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 20 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำออกมารักษาในแจ็กกันที่มีน้ำกลั่น เพื่อศึกษาอายุการปักแจ็กกันในสภาพห้องอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบร่วมกับการพัลซิ่งด้วยสาร 5-SSA ความเข้มข้น 1,000 ล้านในล้านส่วน (part per million, ppm) นาน 6 ชั่วโมงกับดอกระยะที่ 1 มีอายุการปักแจ็กกันนานที่สุดคือ 14.6 วัน และดอกระยะที่ 2 มีอายุการปักแจ็กกันนาน 11.3 วัน ส่วนดอกระยะที่ 1 และ 2 ที่ไม่ได้พัลซิ่งมีอายุการปักแจ็กกันเพียง 8.1 และ 9.2 วันตามลำดับ โดยการพัลซิ่งด้วยสาร 5-SSA มีผลในการเพิ่มจำนวนดอกกริงที่บาน ชะลอการเกิดก้านลีบ และการเปลี่ยนแปลงสีของใบระดับส่วนบนในระหว่างการปักแจ็กกัน

การทดลองที่ 2 ทำการศึกษาสูตรน้ำยาปักแจ็กกันที่เหมาะสมเพื่อยึดอายุการปักแจ็กกันของดอกปทุมมาหลังทำการพัลซิ่งด้วยสาร 5-SSA โดยนำดอกดอกระยะที่ 1 ที่ผ่านการพัลซิ่งด้วยสาร 5-SSA ความเข้มข้น 1,000 ppm นาน 6 ชั่วโมง มาปักในแจ็กกันที่มีส่วนผสมของสาร 5-SSA ความเข้มข้น 50, 100, 250, และ 500 ppm ร่วมกับการใช้หรือไม่ใช้น้ำตาลชูไครส 2 เปอร์เซ็นต์ และการใช้น้ำตาลชูไครส 2 เปอร์เซ็นต์ เพียงอย่างเดียวเป็นน้ำยาปักแจ็กกัน พบร่วมกับน้ำยาปักแจ็กกันทุกสูตรไม่สามารถยึดอายุการปักแจ็กกันของดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูได้ และยังทำให้ชื้อดอกมีอายุการปักแจ็กกันสั้นกว่าชุดควบคุม

จากผลการทดลองสรุปว่าระยะตัดดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูที่เหมาะสมคือ ระยะที่ตัดกริงยังไม่บาน (ระยะที่ 1) และการใช้น้ำยาซึ่งประกอบด้วยสาร 5-SSA ความเข้มข้น 1,000 ppm นาน 6 ชั่วโมง สามารถยึดอายุการปักแจ็กกันได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาปักแจ็กกัน

* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 101 หน้า.

Extending Vase Life of *Curcuma alismatifolia* cv. Chiang Mai Pink by 5-sulfosalicylic Acid

Pichsinee Pintarin*

Abstract

This study looked at the problems associated with fleshly cut flower, specially looking to extend the longevity of patumma when exporting. This experiment was studied extending vase life of patumma (*Curcuma alismatifolia* Gagnep cv. Chiang Mai Pink) by using 5-sulfosalicylic acid (5-SSA).

The experiment was divided into 2 investigations. The first investigation was studying the effects on flowering stage, 5-SSA concentration and pulsing period on the vase life of patumma flowers. Flowers were cut at 2 stages; without true flower or floret blooming (Stage 1) and with one floret blooming (Stage 2). All flowers were pulsed in 5-SSA with various concentration for 6 and 12 hours. The basal end of each treated flower was covered with saturated water soaked cotton wool in small plastic bag and put in a fiberboard carton and kept at $20 \pm 2^\circ\text{C}$ for 24 hours. Thereafter, patumma flower was put in a vase containing distilled water at 25°C for vase life investigation. The first flower stage pulsed with 1,000 ppm of 5-SSA for 6 hours had the longest vase life of 14.6 days and the second flower stage had 11.3 days of vase life while the non-pulsing flowers were only 8.1 and 9.2 days, respectively. 5-SSA caused on the increase of floret blooming number, delaying peduncle flatten and color change of comma bract during vase holding period.

The second investigation studied the effect of vase solution on vase life of 5-SSA pulsed patumma flower. The flowers of first flower stage were pulsed in 1,000 ppm of 5-SSA for 6 hours and transferred to vase solutions constraining of 5-SSA at the concentrations 50, 100, 250 and 500 ppm with/without 2% sucrose and 2% sucrose only. All vase solution formulas could not extend vase life of patumma flower and shorten its vase vase life compared with the control.

The results concluded that the suitable cut flower stage for patumma cv. Chiang Mai Pink was the stage of no floret blooming (Stage 1) and the use of pulsing solution containing 5-SAA at a concentration of 1,000 ppm for 6 hours could extend flower vase life without using vase solution

* Master of Science (Postharvest Technology), Postharvest Technology Research Institute, Chiang Mai University. 101 pages.