

# การป้องกันการเสียสภาพหลังการเก็บเกี่ยวจากเชื้อร้าที่ปนเปื้อนในเห็ดยานางและเห็ดนางรมโดยโดยใช้ แคลเซียมคลอไรด์

ตราวดี ปิงเจี้ยว\*

## บทคัดย่อ

เห็ดยานางและเห็ดนางรมโดยเป็นเศรษฐกิจที่มีความต้องการทางการตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่มีปัญหานั่นที่พับหลังการเก็บเกี่ยวคือเห็ดที่วางจำหน่ายมีอายุสั้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากการเชื้อร้าที่เข้าปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเห็ดทำให้เกิดการเน่าเสีย จากการสำรวจจุลินทรีย์ปนเปื้อนในหัวเชื้อวุ้น 1,360 ชุด หัวเชื้อข้าวฟ่าง 6,120 ชุด หัวเชื้อปีเลือย 4,140 ชุด และก้อนเชื้อปีเลือย 27,600 ก้อน จำนวน 30, 30, 30 และ 60 ไอโซเลต ตามลำดับ เมื่อนำมาตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถจัดจำแนกได้ทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ *Aspergillus fumigates* 22 ไอโซเลต *Aspergillus sclerotiorum* 6 ไอโซเลต *Aspergillus* sp.5 ไอโซเลต *Botryodiplodia* sp. 5 ไอโซเลต *Monilia* sp. 35 ไอโซเลต *Penicillium* sp. 46 ไอโซเลต *P. citrinum* 6 ไอโซเลต *Rhizopus stolonifer* 12 ไอโซเลต *Trichoderma virens* 7 ไอโซเลต และ *Trichoderma atroviride* 6 ไอโซเลต

การสำรวจความเสียหายจากเชื้อร้าปนเปื้อนในแต่ละเดือนของก้อนเชื้อปีเลือยระบะบ่มสีน้ำเงินเวลา 9 เดือน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม พ.ศ. 2551 จำนวนทั้งสิ้น 27,600 ก้อน พบก้อนเชื้อมีการปนเปื้อน 7,655 และความเสียหายเกิดขึ้นมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 59 และน้อยที่สุดในเดือนตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 12 และเชื้อสาเหตุที่พบ ได้แก่ *Aspergillus*, *Penicillium*, *Rhiaopus*, *Trichoderma* และ *Monilia* ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47, 38, 7, 4 และ 3 ของปริมาณเชื้อปนเปื้อนทั้งหมดตามลำดับ เมื่อนำมาทดสอบระดับความต้านทานของเชื้อเห็ดยานางและเชื้อเห็ดนางรมโดยต่อเชื้อปนเปื้อนชนิดต่างๆ ด้วยวิธี Dual Culture พบว่าบนหัวเชื้อวุ้นเชื้อเห็นทั้งสองชนิดถูกรกราน 60-90% ส่วนบนหัวเชื้อข้าวฟ่างถูกรกราน 30-60% และก้อนปีเลือยกูกรกราน 10-30%

จากการศึกษาผลของการปนเปื้อนต่อการให้ผลผลิต โดยก้อนเชื้อปีเลือยเห็ดนางรมโดยมาทำให้ปนเปื้อนด้วยเชื้อ *Aspergillus fumigates* ไอโซเลต AG2 และนีดพ่นผลผลิตด้วย  $\text{CaCl}_2$  ที่ความเข้มข้น 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% และ 2.5% ในระยะสร้างดอก 1, 2 และ 3 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวที่ความสะอาดและความแข็งแรงของเห็ดน้ำดอกเพิ่ม 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ บรรจุเห็ดทั้ง 3 ขนาด ลงในกล่องพลาสติกใสแล้วหุ้มด้วยแผ่นพิล์มโพลีไวนิลคลอไรด์ (PCV) เก็บเห็ดนางรมโดยไว้ที่อุณหภูมิ 4, 10 และ 15 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4, 8 และ 12 วัน พบว่าการนีดพ่นผลผลิตระยะเวลา 1 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว ให้น้ำหนักมากที่สุดที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้ น้ำหนัก 37.7g, 37.0g, 35.5g, 29.6g และ 29.3g ตามลำดับ และที่ระดับความเข้มข้น  $\text{CaCl}_2$  2.5% ให้ผลดีที่สุดที่อายุการเก็บรักษา 4, 8 และ 12 วัน 4 องศาเซลเซียส ค่าความแน่นเนื้อ 42, 38 และ 37 นิวตัน ตามลำดับ ค่าความสว่าง 82, 81 และ 81 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังนั้นสามารถใช้ระยะนีดพ่น 3 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยวด้วยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 2.5% เพราะสามารถป้องกันการเน่าเสียได้

\* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 109 หน้า.

**Prevention of Postharvest Decay Caused by Contaminated Fungi in Yanagi Mushroom (*Agrocybe cylindracea* (Dc. ex Fr.) Maire.) and Blue-Oyster Mushroom (*Pleurotus columbinus* Quel.) Using Calcium Chloride**

Sarawoot Pingkeaw\*

**Abstract**

*Agrocybe cylindracea* (Dc. ex Fr.) Maire. and *Pleurotus columbinus* Quel. are the commercial mushroom in Thailand. One of the most serious problems in those mushrooms is the fungal contamination in the production process that may cause a short shelf life after harvest. Contamination of PDA spawn 1,360 bottles, sorghum spawn 6,120 bottles, sawdust spawn 4,140 bottles and mushroom bag 27,600 bags were investigated. The results show the mold contaminated 30, 30, 30, and 60 isolates respectively. Morphological study was used to identify the isolates that belong to 7 genera including *Aspergillus fumigatus* 22 isolate, *Aspergillus sclerotiorum* 6 isolate, *Aspergillus* sp. 5 isolate, *Botryodiplodia* sp. 5 isolate, *Monilia* sp. 35 isolate, *Penicillium* sp. 46 isolate, *P. citrinum* 6 isolate, *Rhizopus stolonifer* 12 isolate, *Trichoderma atrovirid* 7 isolate and *Trichoderma virens* 6 isolate.

The contaminated of sawdust spawn during February - October 2007 (9 months) in total 27,600 bags. Seven thousand six hundred and fifty-five bag were contaminated, mostly in February 59% and least in October 12 %. The causing contaminants were including *Aspergillus* 47%, *Penicillium* 38%, *Rhizopus* 7%, *Trichoderma* 4% and *Monilia* 3%. The growth rates of mushroom culture versus the contaminant culture in PDA medium, sorghum, and sawdust were also studied. The attack level of mushroom culture versus contaminant culture grown on PDA was 60-90%, while those of sorghum was 60-75% and sawdust was 10-30%

The analysis of contaminant on the produced by inoculate the compost with *Aspergillus fumigatus* isolate AG2 and used Calcium chloride at 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% and 2.5% concentrate was sprayed on young fruiting body 1, 2 and 3 days before harvest. At harvest, three size of mushroom fruiting bodies i.e. small, medium and large were selected, cleaned and placed in transparent plastic boxes wrapped with polyvinyl chloride (PVC) and incubated at 4, 10 and 15°C for 4, 8 and 12 days to lightness and firmness analysis. The results came out that the produced that the most weight was spayed on 1 day after fruiting body at all concentrate have 37.7g, 37.0g, 35.5g, 29.6g and 29.3g respectively. The results showed that firmness of *Pleurotus ostreatus* cv. "Doi" were good with the prevention of decay caused by spayed 2.5% Calcium chloride on 1 day after fruiting body and the most incubated at 4°C for 4, 8 and 12 day at 42, 38 and 37 respectively. Therefore, spraying with 2.5% Calcium chloride on 3 day after fruiting body initiation slow down the decreasing of decay.

---

\* Master of Science (Biology), Faculty of Science, Chiang Mai University, 109 pages.